

## **Fiebre Ilheus (ILH)**

Agente causal o patógeno: Arbovirus. Familia Flaviviridae. Género *Flavivirus*.

Vector: Mosquitos. *Psorophora feroz*, *P. lutzii*, *P. albipes*, *Ochlerotatus serratus*, *O. fulvus*, *O. scapularis*, *Anopheles cruzii* y *Haemagogus leucocolaenus*. Los reservorios son pájaros y diversos mamíferos como roedores, caballos, murciélagos y monos.

Distribución: Panamá, Guatemala, Honduras, Trinidad, Colombia, Guyana Francesa y Brasil.

Descripción: El descubrimiento de este virus se realizó en 1944 en la ciudad de Ilheus (estado de Bahia, Brasil). No es considerado un problema de salud pues se han reportado pocos casos y después del periodo febril hay un completo restablecimiento.

El periodo de incubación es de 7-14 días, tras el cual aparece una fiebre alta, jaqueca severa, escalofríos y mialgia. Algunos pacientes tienen problemas respiratorios y fotofobia. Los síntomas clínicos se alargan durante 3-5 días y después se produce el restablecimiento total. Únicamente se han reportado dos casos en que la enfermedad ha evolucionado hacia una encefalitis.

Tratamiento: Sintomalógico.